

Prije uporabe pažljivo pročitate ovu uputu!

- Spremite uputu. Možda ćete je željeti ponovno pročitati.
- Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj je lijek propisan vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako imaju znakove bolesti koji su slični vašima.

ANGAL[®] S sprej za grlo

CHLORHEXIDINUM, LIDOCAINUM

SASTAV

1 mililitar otopine sadržava 2 mg klorheksidin diglukonata i 0,5 mg lidokain hidroklorida.

Pomoćne tvari: levomentol, eukaliptol, glicerol, saharin-natrij, limunska kiselina monohidrat, etanol, pročišćena voda

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ PAKIRANJA

sprej za usnu sluznicu, otopina

bezbojna otopina s mirisom na mentol i alkohol

smeđa staklena bočica (sa zatvaračem na navoj, mehaničkim raspršivačem i nastavkom za raspršivanje) s 30 ml otopine

FARMAKOTERAPIJSKA GRUPA

antiseptik, lokalni anestetik

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta samo u ljekarnama.

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Angal S djeluje lokalno analgetički i antimikrobno.

Primjenjuje se za simptomatsko i lokalno ublažavanje bolova kod upale ždrijela (bolno gutanje, nadražaj).

KONTRAINDIKACIJE

Angal S nemojte uzimati ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak lijeka.

Ne smiju ga upotrebljavati ni djeca mlađa od 30 mjeseci.

ODGOVARAJUĆE MJERE OPREZA PRI UPORABI

Bolesnici koji su skloni reakcijama preosjetljivosti moraju oprezno uzimati Angal S.

Angal S se upotrebljava kao dodatni lijek za ublažavanje bolova u ždrijelu. Bakterijsku infekciju s povišenom tjelesnom temperaturom treba dodatno liječiti. Ako imate povišenu tjelesnu temperaturu, jake bolove u ždrijelu i teško gutate, posjetite liječnika.

Sprej Angal S sadržava levomentol. Zato ga maloj djeci morate davati oprezno, osobito ako su već imali mišićne grčeve.

Angal S ne sadržava saharozu i zato ga mogu uzimati i bolesnici sa šećernom bolešću.

Treba biti oprezan da otopina ne dospije u oči.

Nakon nanošenja lijeka, najmanje jedan sat, ne bi trebalo konzumirati hranu, piće niti prati zube.

INTERAKCIJE

Ne preporučuje se istodobna primjena Angala S i drugih lokalnih antiseptika ili lijekova za dezinfekciju ždrijela.

Sprej Angal S ne primjenjuje se istodobno s lijekovima koji smanjuju djelovanje enzima holinesteraze (npr. neostigmin, distigmin, piridostigmin).

POSEBNA UPOZORENJA

Trudnoća i dojenje

Prije uporabe bilo kojega lijeka posavjetujte se s liječnikom.

Lijek je namijenjen za lokalnu upotrebu. U literaturi nema podataka o eventualnim štetnim učincima pri kratkotrajnoj primjeni u trudnoći ili dojenju.

Angal S se može kratko vrijeme primjenjivati samo prema priloženom uputstvu.

Utjecaj na psihofizičke sposobnosti

Angal S ne utječe na sposobnost vožnje motornih vozila i na upravljanje strojevima.

Pomoćne tvari koje mogu utjecati na neškodljivost i djelotvorno korištenje lijeka

Angal S sadržava glicerol, koji u velikim dozama može izazvati glavobolju, želučane tegobe ili probavne smetnje.

Treba imati u vidu da 10 ml otopine sadržava 3,5 g etanola.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Angal S uzimajte toliko dugo da ublažite bolove ili smanjite draženje.

Ako se tri do četiri dana nakon upotrebe lijeka zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša, posjetite liječnika.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Za pojedinačnu dozu treba 3 do 5 puta uzastopno pritisnuti mehanički raspršivač. Postupak treba ponoviti od 6 do 10 puta na dan.

Djeca starija od 30 mjeseci

Za pojedinačnu dozu treba 2 do 3 puta uzastopno pritisnuti mehanički raspršivač. Postupak treba ponoviti od 3 do 5 puta na dan.

Slika 1.

Prije upotrebe bolesnik treba okrenuti nastavak za raspršivanje pod pravim kutom u odnosu na bočicu.

Slika 2.

Usta treba jako otvoriti, usmjeriti sprej prema ždrijelu i pritisnuti mehanički raspršivač. Pri prskanju treba zadržati dah.

Nakon upotrebe nastavak za raspršivanje treba okrenuti prema dolje pri čemu se blokira mehanički raspršivač.

PREDOZIRANJE

Kod primjene prevelikih doza (više od jedne bočice raspršivača na dan) mogu se javiti smetnje pri gutanju (smanjena kontrola refleksa gutanja).

Znakovi prekomjernog doziranja, koji se mogu javiti su: nemir, šum u ušima, tegobe s disanjem i poremećaji srčanog ritma.

Pri pojavi znakova otrovanja treba odmah prekinuti uzimanje lijeka. Treba izazvati povraćanje i isprati želudac.

Vjerojatnost komplikacija u slučaju prekomjernog doziranja je radi sastava lijeka vrlo malena.

Ako ste greškom ili zbog nepažnje uzeli preveliku dozu, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

NUSPOJAVE

Kod pravilne upotrebe bolesnici Angal S dobro podnose. Vrlo se rijetko na koži i sluznici mogu javiti znaci preosjetljivosti na lijek, npr. draženje, osip ili preosjetljivosti na svjetlost.

Kod dugotrajne i neprekidne primjene zubi se privremeno mogu obojiti tamnije. To može otkloniti zubar. Dosad nema izvještaja o obojenosti zuba pri upotrebi ograničenoj samo na ždrijelo.

Ako primijetite druge nuspojave, morate obavijestiti svojega liječnika ili ljekarnika.

ROK VALJANOSTI

Lijek ne smijete primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti.

UVJETI ČUVANJA

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25° C.

Lijek treba čuvati izvan dohvata djece.

Datum pripreme upute

Travanj 2005.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj
bočica s 30 ml otopine, u kutiji, reg.br.: UP/I-530-09/05-01/233; 16. lipnja 2005.