

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovu uputu!

- Spremite uputu. Možda ćete je željeti ponovno pročitati.
- Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
- Ovaj je lijek propisan vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako imaju znakove bolesti koji su slični vašima.

ANGAL[®] pastile

CHLORHEXIDINUM, LIDOCAINUM

SASTAV

Jedna pastila sadržava 5 mg klorheksidin dihidroklorida i 1 mg lidokain hidroklorida.

Pomoćne tvari: levomentol, sorbitol, magnezij stearat.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ PAKIRANJA

pastile (bijela ili gotovo bijela okrugla pastila)
dva blistera s po 10 pastila (2x10)

FARMAKOTERAPIJSKA GRUPA

antiseptik, lokalni anestetik

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta samo u ljekarnama.

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Angal djeluje lokalno analgetički i antimikrobno.

Primjenjuje se simptomatsko i lokalno za:

- ublažavanje bolova kod upale ždrijela (bolno gutanje, nadražaj)
- ublažavanje bolova i upale sluznice usta (stomatitis, gingivitis)

KONTRAINDIKACIJE

Angal pastille nemojte uzimati ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak lijeka.

Ne smiju ga upotrebljavati ni djeca mlađa od 5 godina.

ODGOVARAJUĆE MJERE OPREZA PRI UPORABI

Bolesnici skloni reakcijama preosjetljivosti trebaju s oprezom uzimati Angal pastile.

Angal se upotrebljava kao dodatni lijek za ublažavanje bolova kod upale sluznice usta i ždrijela. Bakterijsku infekciju s povišenom tjelesnom temperaturom treba dodatno liječiti.

Angal sadržava levomentol. Zato ga maloj djeci morate davati oprezno, osobito ako su već imali mišićne grčeve.

Angal ne treba uzimati neprekidno duže vrijeme ili prečesto. Smije se uzimati onoliko dugo koliko je potrebno da ublaži bolove ili smanji draženje zbog upale ždrijela.

INTERAKCIJE

Ne preporučuje se istodobna primjena Angala i drugih lokalnih antiseptika ili lijekova za dezinfekciju usta i ždrijela.

Pastile Angal ne primjenjuju se istodobno s lijekovima koji smanjuju djelovanje enzima holinesteraze (npr. neostigmin, distigmin, piridostigmin).

POSEBNA UPOZORENJA

Trudnoća i dojenje

Prije uporabe bilo kojega lijeka posavjetujte se s liječnikom.

Lijek je namijenjen za lokalnu primjenu. U literaturi nema podataka o eventualnim štetnim učincima pri kratkotrajnoj primjeni u trudnoći ili dojenju.

Angal se može kratko vrijeme primjenjivati samo prema priloženom uputstvu.

Utjecaj na psihofizičke sposobnosti

Angal ne utječe na sposobnost vožnje motornih vozila i na upravljanje strojevima.

Važne obavijesti o nekim sastojcima lijeka

Angal pastile sadržavaju sorbitol, pa ih zato mogu upotrebljavati bolesnici sa šećernom bolešću, a nisu primjerene za osobe s prirođenom netolerancijom fruktoze.

Svaka pastila sadržava 1,2 g sorbitola što kod nekih bolesnika može prouzročiti probavne smetnje (proljevi).

DOZIRANJE I PRIMJENA

Pastile su namijenjene za lokalnu primjenu za ublažavanje bolova u usnoj šupljini i ždrijelu. U ustima se pastila polako otopi pri čemu se aktivne tvari postupno oslobađaju.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uobičajena doza je 6 do 10 pastila na dan.

Djeca starija od 5 godina

Uobičajena doza je polovica doze za odrasle, tj. 3 do 5 pastila na dan.

Pastile se smiju uzimati onoliko dugo koliko je potrebno da ublaže bolove ili smanje draženje zbog upale ždrijela.

Ako se tri do četiri dana nakon upotrebe lijeka zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša, posjetite liječnika.

PREDOZIRANJE

Kod primjene prevelikih doza (više od 20 pastila na dan) mogu se javiti smetnje pri gutanju (smanjena kontrola refleksa gutanja).

Znakovi prekomjernog doziranja, koji se mogu javiti su: nemir, šum u ušima, tegobe s disanjem i poremećaji srčanog ritma.

Pri pojavi znakova otrovanja treba odmah prekinuti uzimanje lijeka. Treba izazvati povraćanje i isprati želudac.

Vjerojatnost komplikacija u slučaju prekomjernog doziranja je radi sastava lijeka vrlo malena.

Ako ste greškom ili zbog nepažnje uzeli preveliku dozu, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

NUSPOJAVE

Pri lokalnoj primjeni u ustima i ždrijelu ograničenoj na kraće vrijeme i u preporučenim dozama bolesnici Angal dobro podnose.

Vrlo se rijetko na koži i sluznici mogu pojaviti znaci preosjetljivosti na lijek, npr. draženje ili osip, koji su posljedica preosjetljivosti na anestetike, kao što je lidokain.

Kod dugotrajne i neprekidne primjene zubi se privremeno mogu obojiti tamnije. To može otkloniti zubar.

Ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

ROK VALJANOSTI

Lijek ne smijete primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, koji je naveden na pakiranju.

UVJETI ČUVANJA

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25° C.

Lijek treba čuvati izvan dohvata djece.

Datum pripreme upute

Travanj 2005.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

dva blistera s po 10 pastila (2x10), u kutiji, reg.br.: UP/I-530-09/05-01/232; 16. lipnja 2005.