

**Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovu uputu jer sadržava sve važne podatke.**

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posavjetujte se s ljekarnikom.

## **IMMUNAL®**

### **kapi za povećanje otpornosti organizma**

Dodatak prehrani

#### **SASTAV**

1 ml otopine sadržava 0,8 ml soka iz svježe cvjetne biljke crvene rudbekije (Echinacea purpurea L.)

Ostali sastojci: sorbitol, 20 vol. % etanol.

#### **FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ PAKIRANJA**

otopina, oralne kapi

50 ml otopine u bočici (s dozirnom kapaljkom), u kutiji

#### **IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROMET I UVOZNIKA**

Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

#### **IME I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

#### **NAČIN I MJESTO IZDAVANJA LIJEKA**

Izdaje se bez recepta u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama.

#### **TERAPIJSKE INDIKACIJE**

Immunal je biljni pripravak koji povećava otpornost organizma.

Rudbekija ili ehinaceja sadržava sastojke koji kao nespecifična podražajna sredstva jačaju otpornost organizma. Nespecifična imunska stimulacija očituje se prvenstveno u povećanom broju bijelih krvnih stanica (granulocita) i njihovoj pojačanoj sposobnosti fagocitoze mikroorganizama. Dokazan je i protuvirusni učinak na viruse gripe i herpesa.

#### **Kapi Immunala namijenjene su:**

- za jačanje otpornosti organizma kod općih lakših infekcija, te kod sklonosti čestim prehladama
- za sprječavanje i ublažavanje tegoba kod prehlade i gripe
- za ublažavanje simptoma bolesti kod blagih virusnih i bakterijskih infekcija dišnog sustava (iscjedak iz nosa, upala grla, kašalj, umor)
- kao pomoćno sredstvo pri dugotrajnom liječenju kroničnih infekcija antibioticima.

## KONTRAINDIKACIJE

### Immunal kapi nemojte uzimati ako:

- ste preosjetljivi na biljke iz porodice glavočike cjevnjače (Asteraceae odnosno Compositae) kao što su npr. ambrozija, kamilica, ivančica, maslačak, stolisnik, neven i dr.
- ste preosjetljivi na druge sastojke pripravka
- imate bolesti kao što su tuberkuloza, leukemije (zloćudne bolesti krvotvornog sustava), sistavne bolesti vezivnog tkiva (kolagenoze), multiplu sklerozu, AIDS ili HIV-infekcije, ili druge autoimune bolesti.

Posavjetujte se s ljekarnikom ako niste uvjereni smijete li uzimati kapi Immunal.

## ODGOVARAJUĆE MJERE OPREZA PRI UPORABI

Immunal kapi sadržavaju 20 vol. % etanola. Svaka doza kapi Immunala za djecu od 6 do 12 godina sadržava 0,238 g etanola (alkohola) što odgovara 6 ml pive ili 2,5 ml vina. Svaka doza kapi Immunala za djecu iznad 12 godina starosti i za odrasle sadržava 0,396 g etanola (alkohola) što odgovara 10 ml pive ili 4,2 ml vina.

Primjena je štetna za bolesnike koje imaju oštećenu funkciju jetre, padavicu, smetnje ili bolesti središnjeg živčanog sustava, alkoholičare, trudnice i djecu.

Ako pripravak stoji dulje vrijeme, može se zamutiti ili mogu nastati pahuljice, koje čine ljekoviti polisaharidi. Zato bočicu prije uporabe promućkajte.

## INTERAKCIJE

Ako istodobno uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, pa i ako ste ga dobili bez recepta, prije početka primjene Immunala posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Otopina sadržava etanol što može promijeniti ili pojačati učinak drugih lijekova.

## POSEBNA UPOZORENJA

### Trudnoća i dojenje

Prije nego što uzmete bilo koji lijek posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Nema podataka o mogućem štetnom učinku Immunala u trudnoći i dojenju.

Immunal kapi sadržavaju 20 vol.% etanol (vidi Odgovarajuće mjere opreza pri uporabi).

### Utjecaj na psihofizičke sposobnosti

U propisanoj dozi, Immunal kapi ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

## DOZIRANJE I PRIMJENA

Kapi Immunala doziraju se s priloženom dozirnom kapaljkom. Odmjerenu otopinu istisnite u čašu s malo vode i popijte.

Za postizanje zadovoljavajućeg učinka, kapi treba uzimati najmanje tjedan dana. Kapi Immunala smiju se neprekidno uzimati najviše osam tjedana.

**Odrasli i djeca starija od 12 godina:** 3 puta na dan po 2,5 ml otopine.

**Djeca od 6 do 12 godina:** 3 puta na dan po 1,5 ml otopine.

Ako smatrate da je učinak Immunala prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.  
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

### **Što učiniti ako ste zaboravili uzeti kapi**

Ako ste zaboravili uzeti kapi, uzmite ih čim se sjetite osim, ako se već približilo vrijeme za sljedeću dozu. Dalje se pridržavajte propisanog vremena.  
Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.

### **PREDOZIRANJE**

Ako ste uzeli veću dozu nego što biste smjeli, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.  
Znaci otrovanja kod prevelikih doza nisu poznati. Kod predoziranja mogu se pojaviti simptomi alkoholiziranosti.

### **NUSPOJAVE**

Kao i svi pripravci i Immunal kapi mogu imati nuspojave.  
U pojedinačnim slučajevima zabilježene su reakcije preosjetljivosti kao što su osip, svrbež, otok lica, otežano disanje (dispneja), omaglica ili sniženje krvnog tlaka.  
Ako se jave nuspojave, prestanite uzimati Immunal i posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

O svakoj nuspojavi obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika.

### **ROK VALJANOSTI**

Pripravak se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, označenoga na pakovanju.

### **UVJETI ČUVANJA**

**Pripravak treba čuvati izvan dohvata djece.**

Pripravak se čuva na temperaturi do 25° C.

### **DATUM REVIZIJE UPUTE**

Srpanj, 2007.

### **Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj**

50 ml otopine u bočici (s dozirnom kapaljkom), u kutiji, reg. br.: UP/I-541-02/07-01/338; ur. br.: 534-08-01/8-07-4; 25. srpnja 2007.