

**Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovu uputu jer sadržava sve važne podatke.**

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posavjetujte se s ljekarnikom.

## **IMMUNAL®**

### **tablete za povećanje otpornosti organizma**

dodatak prehrani

### **SASTAV**

Jedna tableta sadržava 80 mg suhog soka iz svježe cvjetne biljke crvene rudbekije (*Echinacea purpurea* L., herba, succus siccum, 31 – 60 : 1).

Ostali sastojci: magnezijev stearat, laktoza monohidrat, koloidni bezvodni silikagel, sladilo: natrijev saharinat, aroma: vanilin, trešnja.

### **FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ PAKIRANJA**

tablete

20 (1x20) tableta u blisteru, u kutiji

### **IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROMET I UVOZNIKA**

Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska.

### **IME I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

### **NAČIN I MJESTO IZDAVANJA LIJEKA**

Izdaje se bez recepta u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama.

### **TERAPIJSKE INDIKACIJE**

Immunal je biljni pripravak koji povećava otpornost organizma.

Rudbekija ili ehinaceja sadržava sastojke koji kao nespecifična podražajna sredstva jačaju otpornost organizma. Nespecifična imunska stimulacija očituje se prvenstveno u povećanom broju bijelih krvnih stanica (granulocita) i njihovoj pojačanoj sposobnosti fagocitoze mikroorganizama. Dokazan je i protuvirusni učinak na viruse gripe i herpesa.

#### **Tablete Immunala namijenjene su:**

- za jačanje otpornosti organizma kod općih lakših infekcija, te kod sklonosti čestim prehladama
- za sprječavanje i ublažavanje tegoba kod prehlade i gripe
- za ublažavanje simptoma bolesti kod blagih virusnih i bakterijskih infekcija dišnog sustava (iscjedak iz nosa, upala grla, kašalj, umor)
- kao pomoćno sredstvo pri dugotrajnom liječenju kroničnih infekcija antibioticima.

## **KONTRAINDIKACIJE**

### **Immunal tablete nemojte uzimati ako:**

- ste preosjetljivi na biljke iz porodice glavočike cjevnjače (Asteraceae odnosno Compositae) kao što su npr. ambrozija, kamilica, ivančica, maslačak, stolisnik, neven i dr.
- ste preosjetljivi na druge sastojke pripravka
- imate bolesti kao što su tuberkuloza, leukemije (zloćudne bolesti krvotvornog sustava), sistavne bolesti vezivnog tkiva (kolagenoze), multiplu sklerozu, AIDS ili HIV-infekcije, ili druge autoimune bolesti.

Posavjetujte se s ljekarnikom ako niste sigurni smijete li uzimati tablete Immunal.

## **INTERAKCIJE**

Ako istodobno uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, pa i ako ste ga dobili bez recepta, prije početka primjene Immunala posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Do sada nisu poznata značajna međusobna djelovanja kod istodobne primjene Immunala i drugih lijekova.

## **POSEBNA UPOZORANJA**

### **Trudnoća i dojenje**

Prije nego što uzmete bilo koji lijek posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Nema podataka o mogućem štetnom djelovanju Immunala u trudnoći i dojenju.

### **Utjecaj na psihofizičke sposobnosti**

Nema podataka o utjecaju Immunal tableta na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

## **DOZIRANJE I PRIMJENA**

Tabletu progutajte s dovoljnom količinom tekućine – uzmite je s čašom vode.

Za postizanje zadovoljavajućeg učinka, Immunal tablete treba uzimati najmanje tjedan dana. Immunal tablete smiju se neprekidno uzimati najviše osam tjedana.

**Odrasli i djeca starija od 12 godina:** 1 tableta tri do četiri puta na dan.

**Djeca od 6 do 12 godina:** 1 tableta jedanput do tri puta na dan.

**Djeca od 4 do 6 godina:** 1 tableta jedanput do dva puta na dan.

Djeci koja ne mogu progutati tabletu, potrebno je tabletu zdrobiti u žličici i otopiti je u vodi, čaju ili voćnom soku.

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.

Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

### **Što učiniti ako ste zaboravili uzeti tabletu**

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite osim, ako se već približilo vrijeme za sljedeću dozu. Dalje se pridržavajte propisanog vremena uzimanja.

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.

## **PREDOZIRANJE**

Znaci otrovanja kod prevelikih doza nisu poznati.

## **NUSPOJAVE**

Kao i svi pripravci i Immunal tablete mogu imati nuspojave.

U pojedinačnim slučajevima zabilježene su reakcije preosjetljivosti kao što su osip, svrbež, otok lica, otežano disanje (dispneja), omaglica ili sniženje krvnog tlaka.

Ako se jave nuspojave, prestanite uzimati tablete Immunal i posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

O svakoj nuspojavi obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika.

## **ROK VALJANOSTI**

Pripravak se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, označenoga na pakovanju.

## **UVJETI ČUVANJA**

**Pripravak treba čuvati izvan dohvata djece.**

Pripravak se čuva pri temperaturi do 25° C.

## **DATUM REVIZIJE UPUTE**

Srpanj, 2007.

**Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj**

20 tableta u blisteru, u kutiji, reg. br.: UP/I-541-02/07-01/337; ur. br.: 534-08-01/8-07-4;  
25. srpnja 2007.